

GROUPE	3	INSECTICIDE
--------	----------	-------------

ÉTIQUETTE SUPPLÉMENTAIRE**Insecticide WARRIOR®**

USAGE AGRICOLE

Pour la suppression des insectes dans les légumineuses (groupe de cultures 6)

GARANTIE :

Lambda-cyhalothrine 122 g/L

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
BIEN AGITER AVANT L'UTILISATION

DANGER**POISON**

IRRITANT POUR LES YEUX et LA PEAU
PEUT SENSIBILISER LA PEAU

N° D'HOMOLOGATION **26837**

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : **1 L - 3,78 L****Syngenta protection des cultures Canada, Inc.**

140 Research Lane, Research Park

Guelph, Ontario

N1G 4Z3

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'EMPOISONNEMENT, consulter **IMMÉDIATEMENT** un médecin ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion, faire boire un ou deux verres d'eau et provoquer le vomissement. Consulter **IMMÉDIATEMENT** un médecin ou un centre antipoison. Si la victime est inconsciente, lui donner de l'air. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente, ni tenter de la faire vomir.

En cas de contact avec les yeux, les rincer à grande eau propre pendant au moins 15 minutes et obtenir des soins médicaux **IMMÉDIATEMENT**.

En cas de contact avec la peau, laver **IMMÉDIATEMENT** la peau atteinte avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation, consulter un médecin ou un centre antipoison.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Si le produit est ingéré, faire un lavage d'estomac en prenant soin d'éviter l'aspiration du contenu gastrique. Administrer un traitement symptomatique. Ce produit peut irriter la peau et les yeux; administrer un traitement symptomatique. En cas d'exposition du visage ou d'autres endroits sensibles, certaines personnes peuvent ressentir un picotement ou un engourdissement. Il s'agit d'un effet passager qui n'endommage pas la peau.

PRÉCAUTIONS

1. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. Garder le produit inutilisé dans le contenant d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit verrouillé, à l'écart de la nourriture.
2. Mortel/poison en cas d'ingestion. L'insecticide WARRIOR est légèrement irritant pour la peau et les yeux. Peut causer la sensibilisation cutanée. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Si les mains sont contaminées, les laver à l'eau savonneuse avant de

toucher à d'autres parties de la peau. Pour l'application, les travailleurs doivent porter un pantalon long, une chemise à manches longues et des bottes à l'épreuve des produits chimiques. Pendant le mélange, le chargement, les activités de nettoyage et de réparations, ils doivent aussi porter des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes antiéclaboussures, un écran facial et une protection respiratoire à cartouche contre les vapeurs organiques avec pré-filtre contre les pesticides approuvé par NIOSH/MSHA/BHSE OU une protection respiratoire avec boîte filtrante contre les pesticides approuvé par NIOSH/MSHA/BHSE. Éviter de se toucher le visage avec des gants ou des vêtements contaminés. Laver les gants avant de les retirer. Laver l'équipement de protection avec de l'eau savonneuse après chaque usage.

3. Ce produit est très toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. Il contient aussi un distillat de pétrole qui est lui-même modérément à hautement toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas contaminer les étangs, lacs ou cours d'eau pendant le remplissage ou le rinçage du pulvérisateur, ni pendant la pulvérisation. Ne pas appliquer à moins de 15 mètres de tout plan d'eau poissonneux ou servant d'habitat au gibier d'eau lorsqu'on utilise un pulvérisateur à rampe, ou à moins de 80 mètres lorsqu'on utilise un pulvérisateur pneumatique.
4. Ce produit est très toxique pour les abeilles. Éviter de pulvériser lorsque les abeilles butinent. Le produit pulvérisé doit être sec avant que les abeilles ne recommencent à butiner dans les cultures traitées.
5. Ne pas appliquer lorsque les conditions atmosphériques favorisent la dérive en dehors des zones ciblées.
6. Les cultures traitées avec l'insecticide WARRIOR peuvent servir à l'alimentation des bovins laitiers qui ne sont pas en lactation et des autres bestiaux, pourvu qu'un délai de 14 jours soit respecté entre l'application et la récolte ou l'utilisation du pâturage. Ne pas faire paître les bovins laitiers en lactation dans les pâturages ou les céréales vertes traités, ni utiliser celles-ci comme fourrage.
7. Ne pas pénétrer dans la zone traitée moins de 24 heures après le traitement. S'il faut pénétrer dans la zone traitée plus tôt que prévu, les travailleurs doivent porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des gants résistant aux produits chimiques, des bottes de travail et un chapeau.
8. Ne pas appliquer du haut des airs.
9. Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à l'écart des aliments et hors de la portée des enfants et des animaux. Conserver au-dessus de 0 °C. Bien agiter avant l'emploi.

NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Porter un équipement de protection approprié (gants, lunettes, tablier) lorsqu'on tente de nettoyer un déversement. Si le contenant fuit, colmater la fuite et placer le contenant dans un baril ou un sac de plastique épais. Communiquer avec Syngenta protection des cultures Canada, inc. (voir le NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE) pour de plus amples détails.

En cas de déversement ou de fuite, endiguer et absorber le liquide à l'aide d'une matière inerte (terre, argile, litière pour chats, etc.). Absorber le produit déversé avec le matériau inerte, ramasser à la pelle et mettre le tout dans un contenant d'élimination pouvant être scellé.

Sur les surfaces dures - Répandre une mince couche de détergent sur les lieux du déversement et y incorporer un peu d'eau avec un balai-brosse. Laisser reposer 10 minutes, puis absorber avec le matériau inerte et déposer à la pelle dans le contenant d'élimination.

Sur le sol - Enlever les premiers 15 cm de terre sur les lieux du déversement et les remplacer par de la nouvelle terre. Éliminer tous les déchets, y compris le balai-brosse, conformément aux règlements provinciaux. Pour de plus amples renseignements sur l'élimination des déchets et le nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements

ÉLIMINATION DU CONTENANT

ÉLIMINATION DES BIDONS DE PLASTIQUE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans la cuve.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-866-327-8633 (FASTMED)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

L'insecticide WARRIOR est un pyréthrianoïde de synthèse photostable. Cet insecticide d'ingestion et de contact à action rapide est efficace contre un large éventail de ravageurs foliaires. Il n'a pas d'effet par inhalation ni systémique. Pour obtenir un résultat optimal, faire un dépistage périodique et appliquer l'insecticide WARRIOR aux premiers stades de

développement des ravageurs.

AVIS À L'UTILISATEUR :

LE MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne la nouvelle utilisation décrite dans cette étiquette supplémentaire, a été établi par des personnes autres que Syngenta protection des cultures Canada, inc. et a été homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Syngenta protection des cultures Canada, inc. ne formule aucune allégation et n'offre aucune garantie quant au maintien de l'efficacité du produit ou à la tolérance des cultures (phytotoxicité du produit) lorsque ce produit est appliqué sur les cultures mentionnées ci-dessous.

MODE D'EMPLOI

Pour certaines espèces d'insectes, la toxicité relative des insecticides à base de pyréthrinoïdes faiblit à mesure que la température s'élève. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, appliquer l'insecticide WARRIOR tôt le matin, avant que la température ne s'élève, ou le soir, lorsque la température baisse. Utiliser suffisamment d'eau pour obtenir une couverture uniforme du feuillage, soit de 100 à 200 L/ha à l'aide d'un pulvérisateur terrestre.

Pour les applications avec un pulvérisateur de plein champ, ne pas appliquer à moins de 15 mètres de tout plan d'eau poissonneux ou servant d'habitat au gibier d'eau.

Il est préférable, pour déterminer le moment optimal du traitement contre des espèces spécifiques de ravageurs, de faire le dépistage des populations et du développement des insectes. Habituellement, l'insecticide WARRIOR donne de meilleurs résultats contre les premiers stades de développement des insectes qui se nourrissent en surface, et contre les insectes adultes qui pondent leurs oeufs dans la plante. Suivre les recommandations du service local de dépistage des ravageurs pour connaître le moment propice au traitement dans votre région. Suivre les recommandations du calendrier de pulvérisation provincial pour connaître les dates optimales des programmes d'applications.

Épandage terrestre seulement

Culture	Insectes	Dose (mL/ha)	Moment du traitement	Remarques
Soja	Sauterelles Puceron du soja Vers-gris ¹ Punaise Lygus	83 mL de produit/ha dans 100-200L d'eau/ha	La nécessité de traiter doit être établie d'après le dépistage local, en fonction de la présence de stades de développement vulnérables et de fortes populations d'insectes. Consulter le personnel agricole local et les directives provinciales au sujet de l'utilisation de ce produit. Selon les directives provinciales de lutte au puceron du soja, il est recommandé d'appliquer un traitement insecticide pendant le stade de la floraison du soja. ¹Les vers-gris sont particulièrement actifs tard en soirée et pendant la nuit. Appliquer l'insecticide WARRIOR le plus près possible du moment de l'activité trophique. ² Pour supprimer la pyrale du maïs, appliquer l'insecticide WARRIOR avant que les larves ne pénètrent dans les tiges ou les gousses.	NE PAS appliquer moins de 14 jours avant la récolte de toutes les légumineuses et cultures du groupe 6 (à l'exception du soja). NE PAS appliquer moins de 21 jours avant la récolte du soja. NE PAS faire plus de 3 applications par saison. NE PAS laisser paître le bétail dans la culture traitée, ni récolter le fourrage, la paille ou le foin traités pour l'alimentation du bétail.
Haricots comestibles, succulents et secs	Vers-gris ¹ Pyrale du maïs ² Cicadelle de la pomme de terre Punaise Lygus			
Pois succulents	Vers-gris ¹ Puceron du pois Cicadelle de la pomme de terre			
Pois secs	Sauterelles Puceron du pois Vers-gris ¹			
Féverole à petits grains	Punaise Lygus Cicadelle de la pomme de terre Puceron du pois			
Pois chiches	Sauterelles Cicadelle de la pomme de terre Vers-gris ¹			
Lentilles	Sauterelles Puceron du pois Punaise Lygus Cicadelle de la pomme de terre Vers-gris ¹			

Recommandations pour la gestion de la résistance

Gestion de la résistance à l'insecticide WARRIOR, insecticide du groupe 3. Toute population d'insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à l'insecticide WARRIOR et à d'autres insecticides du groupe 3. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux insecticides :

Dans la mesure du possible, alterner l'insecticide WARRIOR ou les insecticides du même groupe 3 avec des insecticides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes

nuisibles.

Éviter d'appliquer plus que le nombre maximal de traitements ou de traitements consécutifs de l'insecticide WARRIOR tels que précisés dans cette étiquette, ou d'autres insecticides du même groupe, au cours d'une même saison.

Utiliser des mélanges en cuve contenant des insecticides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.

Utiliser les insecticides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.

Inspecter les populations d'insectes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.

Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.

Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser au 1-87S-YNGENTA (1-877-964-3682) ou à www.syngenta.ca.

WARRIOR est une marque de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.